


# ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021

## ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ

18/06/2021

### ΘΕΜΑ Α

- A1.  $\beta$
- A2.  $\gamma$
- A3.  $\alpha$
- A4.  $\beta$
- A5.  $\delta$



### ΘΕΜΑ Β

#### B1. α.

$_{11}Na$   $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$  3<sup>η</sup> περίοδος, 1η ομάδα  
 $_{16}S$   $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$  3<sup>η</sup> περίοδος, 16η ομάδα  
 $_{19}K$   $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$  4<sup>η</sup> περίοδος, 1η ομάδα

Το Na και το K ανήκουν στην ίδια ομάδα του ΠΠ. Κατά μήκος μιας ομάδας του ΠΠ από πάνω προς τα κάτω, όπως αυξάνεται ο κύριος κβαντικός αριθμός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας. Έτσι,  $r_{Na} < r_K$

Το Na και το S ανήκουν στην ίδια περίοδο του ΠΠ. Κατά μήκος μιας περιόδου του ΠΠ από αριστερά προς τα δεξιά, αυξάνεται το φορτίο του πυρήνα οπότε αυξάνεται και το δραστικό πυρηνικό φορτίο, οπότε ελαττώνεται η ατομική ακτίνα. Έτσι  $r_S < r_{Na}$ .

Συνεπώς:  $r_S < r_{Na} < r_K$

## ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


β. Κατά μήκος μιας περιόδου του ΠΠ από αριστερά προς τα δεξιά, αυξάνεται το φορτίο του πυρήνα οπότε αυξάνεται και το δραστικό πυρηνικό φορτίο, οπότε ελαττώνεται η ατομική ακτίνα.

Συνεπώς, απαιτείται μεγαλύτερο ποσό ενέργειας ώστε να απομακρυνθεί το πιο χαλαρά συγκρατούμενο ηλεκτρόνιο από το άτομο του S, στη θεμελιώδη κατάσταση και σε αέρια φάση.

$E_{i1}(Na) < E_{i1}(S)$

**B2.α.** Με την προσθήκη διαλύματος  $H_2SO_4$  αυξάνεται η  $[H_3O^+]$  στο διάλυμα, άρα σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier η θέση χημικής ισορροπίας μετατοπίζεται δεξιά, τείνοντας να αναιρέσει τη μεταβολή που επιφέραμε, γι' αυτό και επικρατεί το πορτοκαλί χρώμα του  $Cr_2O_7^{2-}$ .

**β.** Με την προσθήκη  $NaOH$ , το  $NaOH$  διίσταται σύμφωνα με την αντίδραση:



οπότε τα  $OH^-$  που προκύπτουν αντιδρούν με τα  $H_3O^+$  οπότε προκαλείται μείωση της  $[H_3O^+]$  στο διάλυμα, άρα σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier η θέση χημικής ισορροπίας μετατοπίζεται αριστερά, τείνοντας να αναιρέσει τη μεταβολή που επιφέραμε, γι' αυτό και επικρατεί το κίτρινο χρώμα του  $CrO_4^{2-}$ .

**B3.**

Το ιόν  $He^+$  είναι υδρογονοειδές, συνεπώς η ενέργεια του ηλεκτρονίου καθορίζεται μόνο από τον κύριο κβαντικό αριθμό. Για τις δύο μεταπτώσεις, έχουμε:

$$i) 4p \rightarrow 3s \quad |\Delta E_{4 \rightarrow 3}| = \left| \frac{E_1}{3^2} - \frac{E_1}{4^2} \right| = \frac{7E_1}{144}$$

$$4p \rightarrow 3d \quad |\Delta E_{4 \rightarrow 3}| = \left| \frac{E_1}{3^2} - \frac{E_1}{4^2} \right| = \frac{7E_1}{144}$$


Ισχύει ότι  $|\Delta E| = h \cdot v$  άρα οι συχνότητες των δύο μεταπτώσεων είναι ίσες.

**B4.α.**

Όσο μεγαλύτερη είναι η pKa ενός οξέος, τόσο μικρότερη είναι η Ka και συνεπώς έχουμε ασθενέστερο οξύ.

Υποκαταστάτες με ισχυρό αρνητικό επαγωγικό φαινόμενο (-I) αυξάνουν την ισχύ των καρβοξυλικών οξέων καθώς έλκουν το ηλεκτρονιακό νέφος του δεσμού O-H του οξέος, αφήνοντας το H σχεδόν «γυμνό» από ηλεκτρόνια, διευκολύνοντας την απόσπασή του.



Συνεπώς, για την ισχύ του -I επαγωγικού φαινομένου των υποκαταστατών, ισχύει:



$$\beta. Ka (CF_3COOH) = 10^{0,25} > Ka (CFH_2COOH) = 10^{-2,7}$$

Το επαγωγικό φαινόμενο έχει αθροιστικές ιδιότητες. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των υποκαταστατών με -I επαγωγικό φαινόμενο, αυξάνεται η τάση για αποβολή των  $H^+$  κι έτσι αυξάνεται και η ισχύς του οξέος.

**B5.** Η δομή A του συμπλόκου είναι συμμετρική που σημαίνει ότι οι διπολικές ροπές αναιρούνται. Συνεπώς, η συνολική διπολική ροπή του μορίου είναι μηδέν. Στη δομή B όμως, οι διπολικές ροπές δεν αλληλοαναιρούνται καθιστώντας το μόριο πολικό. Γνωρίζουμε ότι πολικά μόρια διαλύονται σε πολικούς διαλύτες και μη πολικά σε μη πολικούς («Τα όμοια διαλύουν όμοια») καθώς αναπτύσσονται ισχυρές διαμοριακές δυνάμεις ίδιου τύπου ανάμεσα στα μόρια της διαλυμένης ουσίας και του διαλύτη. Άρα, το μόριο B διαλύεται στο νερό, το οποίο είναι πολικός διαλύτης, ενώ το μόριο A όχι.



**ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**



$$K_b = 10^{-8} \Rightarrow x = 10^{-4,5} M \Rightarrow pOH = 4,5 \Rightarrow pH = 9,5$$

β)



αρχ. 0,002 0,004

IΣ/2 - 0,002 0,002

$$n_{\text{HA}} = 0,004 \text{ mol}, n_{\text{NaOH}} = 0,002 \text{ mol}$$

$$[\text{HA}] = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{30 \cdot 10^{-3}} = \frac{2}{30} M \quad [\text{NaA}] = \frac{2}{30} M$$

Έχουμε ΡΔ άρα με εξίσωση Henderson-Hasselbalch

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} \Rightarrow pH = -\log 10^{-6} + \log \frac{\frac{2}{30}}{\frac{2}{30}} \Rightarrow pH = 6$$

Γ2.

$$c_1 = c_2 = 0,2M$$

$$n_B = 0,2 \cdot 0,02 = 0,004 \text{ mol} \quad n_{\text{HCl}} = 0,2 \cdot V_{I\Sigma}$$




αρχ 0,2V<sub>IΣ</sub> 0,004

IΣ 0,004

$$\Sigma \text{to I}\Sigma: n_B = n_{\text{HCl}} \Rightarrow 0,2V_{I\Sigma} = 0,004 \Rightarrow V_{I\Sigma} = 0,02L = 20mL$$

$$[\text{BH}^+ \text{Cl}^-] = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-3}} = 0,1M$$



Τελ - 0,1 0,1



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

$$K_a \cdot K_b = K_w \Rightarrow K_a = 10^{-8} \Rightarrow \frac{y^2}{0,1} = 10^{-8} \Rightarrow y = 10^{-4,5}M \Rightarrow pH = 4,5$$

**Γ3.**


$pH_{I\Sigma Y_1} = 9,5$  άρα καταλληλότερος δείκτης το κίτρινο της αλιζαρίνης

$pH_{I\Sigma Y_2} = 4,5$  άρα καταλληλότερος δείκτης η ηλιανθίνη

Στην περιοχή αλλαγής χρώματος του δείκτη πρέπει να περιλαμβάνεται το pH του ΙΣ ή η περιοχή αλλαγής χρώματος του δείκτη να βρίσκεται πάνω στο κατακόρυφο τμήμα της ογκομέτρησης.

**Γ4.**

$$n_{HA} = 0,2V, n_{HB} = 0,2V$$




$$\text{αρχ} \quad 0,2V \quad 0,2V$$

$$\text{τελ} \quad \quad \quad 0,2V$$



$$0,2V \quad 0,2V \quad 0,2V$$



Οι δύο ουσίες έχουν ίδια αρχική συγκέντρωση και ίσες σταθερές ιοντισμού άρα θα προκύπτει  $[OH^-] = [H_3O^+]$  οπότε το διάλυμα θα είναι ουδέτερο.

**Γ5.**




άρα η θερμοκρασία αυξάνεται.

**ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

## ΘΕΜΑ Δ

### Δ1.



Αρχ. n n

Αντ. -x -3x

Παρ.

X.I. n-x n-3x

+2x

2x

Στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας η αναλογία των mol είναι και αναλογία των όγκων.

$$\frac{V_{NH_3,XI}}{V_{o\lambda,XI}} = \frac{n_{NH_3,XI}}{n_{o\lambda,XI}} = \frac{2x}{2n - 2x} = \frac{20}{100} = \frac{1}{5} \Rightarrow 10x = 2n - 2x \Rightarrow 12x = 2n \Rightarrow$$

$$n = 6x$$

Έλεγχος περίσσειας

1 mol  $N_2$  με 3 mol  $H_2$

n mol  $N_2$  με 3n mol  $H_2$ , έχω n mol  $H_2$  άρα  $H_2$  σε έλλειμμα

$$\alpha = \alpha_{\varepsilon\lambda\lambda} = \alpha_{H_2} = \frac{3x}{n} = \frac{3x}{6x} = 0,5 \text{ ή } 50\%$$

### Δ2.

$$2n - 2x = 10 \Rightarrow 12x - 2x = 10 \Rightarrow 10x = 10 \Rightarrow x = 1$$

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} = \frac{\left(\frac{2}{V}\right)^2}{\frac{5}{V} \left(\frac{3}{V}\right)^3} \Rightarrow \frac{20}{27} = \frac{V^2 \cdot 4}{5 \cdot 27} \Rightarrow 100 = 4V^2 \Rightarrow V^2 = 25 \Rightarrow V = 5L$$

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

**Δ3.**

a)



αρχ 2

αντ/παρ -y +y +y

XI 2-y y y

$$\alpha = y/2 \Rightarrow y = 1 \text{ mol}$$

$$u_1 = k_1$$

$$u_2 = k_2 [\text{CO}_2]$$

β) Αφού δίνεται ο μέγιστος ρυθμός μεταβολής του  $\text{CO}_2$  είναι 0,4 M/min

$$\text{άρα } u_{\alpha\rho\chi} = u_1 = k_1 = 0,4 \text{ M/min}$$

$$\text{Στη XI } u_2 = u_1 \Rightarrow k_2 \cdot y / 1 = 0,4 \Rightarrow k_2 = 0,4 \text{ m/n}^{-1}$$

γ) Για να γίνει η πίεση υποδιπλάσια πρέπει να μείνουν στο δοχείο 0,5 mol  $\text{CO}_2$  γιατί ούκος και θερμοκρασία είναι σταθερά

$$P' = P/2 \Leftrightarrow n' = n/2 = 0,5 \text{ mol}$$

Αυτή η ποσότητα του  $\text{CO}_2$  δεν ικανοποιεί το  $K_c$ , οπότε δεν έχω ισορροπία και η αντίδραση πρέπει να γίνει μονόδρομη



αρχ 2

αντ/παρ -2 +2 +2

ΤΕΛ 0 2 2

Άρα για να μείνουν 0,5 mol  $\text{CO}_2$  πρέπει να αφαιρεθούν 1,5 mol  $\text{CO}_2$

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ