

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

06/06/2024

ΘΕΜΑ Α

A1. β

A2. α

A3. α

A4. δ

A5.


1. Σωστό

2. Σωστό

3. Λάθος

4. Λάθος

5. Σωστό



ΘΕΜΑ Β

B1.

α. $_{18}\text{X}:1s^22s^22p^63s^23p^6$ $_{19}\text{Y}:1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$

β. Χ: τομέας p, 3^η περίοδος, 18^η ομάδα

Υ: τομέας s, 4^η περίοδος, 1^η ομάδα

γ. Σωστό το (ii)

Τα στοιχεία με ατομικούς αριθμούς 16,17,18 βρίσκονται στην ίδια περίοδο και η Ε1 αυξάνεται προς τα δεξιά κατά μήκος μιας περιόδου αφού αυξάνεται το πυρηνικό φορτίο. Το στοιχείο με ατομικό αριθμό 19 βρίσκεται στην επόμενη περίοδο άρα η απόσπαση ηλεκτρονίου γίνεται από πιο απομακρυσμένη στιβάδα άρα θα έχει την μικρότερη Ε1.

B2.

α. Παρουσία υγρασίας η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier οπότε θα παρατηρηθεί μετατροπή του μπλε χρώματος σε ροδόχρουν.

β. Εφόσον το χρώμα του στερεού γίνεται μπλε, η αύξηση θερμοκρασίας μετατοπίζει την ισορροπία προς τα αριστερά. Σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier η αύξηση θερμοκρασίας ευνοεί την ενδόθερμη πορεία μιας αντίδρασης άρα η αντίδραση προς τα αριστερά είναι ενδόθερμη οπότε σύμφωνα με νόμο Lavoisier-Laplace η αντίδραση προς τα δεξιά είναι εξώθερμη.

B3.

α. Το LiH είναι ιοντική ένωση και μεταξύ των ιόντων εμφανίζονται ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb οπότε το σημείο βρασμού είναι ιδιαίτερα υψηλό.

β. Στο HF εμφανίζονται δεσμοί υδρογόνου που είναι ισχυρότερες διαμοριακές δυνάμεις από τις δυνάμεις διπόλου-διπόλου που εμφανίζονται στα υπόλοιπα υδραλογόνα οπότε το HF έχει το υψηλότερο σημείο βρασμού παρόλο που έχει την μικρότερη Mr.

γ. Στο HBr και στο HCl εμφανίζονται δυνάμεις διπόλου-διπόλου και δυνάμεις London αλλά μεγαλύτερο σημείο βρασμού έχει το HBr επειδή έχει μεγαλύτερη Mr από το HCl ($M_r \text{ HCl}=36,5$ και $M_r \text{ HBr}=81$) οπότε οι δυνάμεις London σε αυτό είναι ισχυρότερες.







B4.


Το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη και δεξιά της Εα αναπαριστά το πλήθος μορίων που μπορούν να δώσουν αποτελεσματική-ενεργή σύγκρουση σε κάθε T. Αφού με T_1 το εμβαδόν αυτό είναι μεγαλύτερο συμπεραίνουμε πως $T_1 > T_2$ καθώς σε μεγαλύτερη θερμοκρασία αυξάνεται η μέση κινητική ενέργεια των μορίων, μεγαλύτερο ποσοστό των μορίων ξεπερνάει το φράγμα της ενέργειας ενεργοποίησης Εα και επομένως θα έχουμε μεγαλύτερο πλήθος αποτελεσματικών συγκρούσεων. Οπότε επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταχύτητα αντίδρασης.

ΘΕΜΑ Γ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γ1α.





Για την t₁

$$x = 0,1 \text{ mol}$$


Άρα

$$n_W = 0,6 - 2 \cdot 0,1 = 0,4 \text{ mol}$$

Οπότε

$$v_{t_1} = 10^{-3} \cdot \left(\frac{0,4}{2}\right)^2 = 4 \cdot 10^{-5} \text{ M/s}$$

$$v_{t_1} = -\frac{1}{2} \frac{d[\Psi]}{dt} \Rightarrow v_W = 8 \cdot 10^{-5} \text{ M/s}$$



Για την t₂ το Ψ είναι σε περίσσεια


$$0,6 - 2\omega + \omega = 0,4 \Rightarrow \omega = 0,2 \text{ mol}$$

Επομένως η σύσταση όλων των σωμάτων τη χρονική στιγμή t₂ περιέχονται

0 mol X και 0,2 mol Ψ και 0,2 mol Ω

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.



$$K_a = \frac{x(x+y)}{1-x} = \frac{x(x+y)}{1} \quad (1)$$

$$K_a' = \frac{y(x+y)}{0,8-y} = \frac{y(x+y)}{0,8} \quad (2)$$


Από (1) και (2): $K_a + 0,8K'_a = x(x+y) + y(x+y) \Rightarrow 10^{-5} + 8 \cdot 10^{-5} = (x+y)^2$

$\Rightarrow 9 \cdot 10^{-5} = (x+y)^2 \Rightarrow \sqrt{9 \cdot 10^{-5}} = (x+y) \Rightarrow [H_3O^+] = 33 \cdot 10^{-3} = 3,3 \cdot 10^{-2} M$

Δ2.

α.

Έστω V_1 ο όγκος του Y_1 και V_2 ο όγκος του Y_2 που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του ρυθμιστικού διαλύματος.



Αρχ. $0,5V_1 \quad V_2 \quad 0$

Τελ. $0,5V_1 - V_2 \quad 0 \quad V_2$

$V_{\max} = V_1 + V_2$

$[NH_3] = \frac{0,5V_1 - V_2}{V_1 + V_2}$

$[NH_4Br] = \frac{V_2}{V_1 + V_2}$

Από εξ. Henderson-Hasselbalch:

$pOH = pK_b + \log \frac{[NH_4Br]}{[NH_3]} \quad pK_b + pOH = 14 \quad 5 = 5 + \lg \frac{V_2}{0,5V_1 - V_2} \Rightarrow 0,5V_1 - V_2 = V_2 \Rightarrow$

$0,5V_1 = 2V_2 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{1}$

Διερεύνηση:

Έστω ότι λαμβάνεται όλο το Y_2 , δηλ. $V_2 = 100 mL$, άρα $V_1 = 400 mL$ ΑΤΟΠΟ


Άρα, λαμβάνεται όλο το Y_1 , δηλ. $V_1 = 100 mL$, άρα $V_2 = 25 mL$

Επομένως $V_{\max} = V_1 + V_2 \Rightarrow V_{\text{τελ}} = 125 mL$

β.


Το Y_3 (ΡΔ) έχει $pH=9$ και ο δείκτης δεν επηρεάζει το pH του διαλύματος, άρα $[H_3O^+] = 10^{-9} M$.

Για το δείκτη HA έχω:







$C - x \quad || \quad x \quad 10^{-9}$

$K_{HA} = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]} \Rightarrow 10^{-9} = \frac{x \cdot 10^{-9}}{C - x} \Rightarrow \frac{x}{C - x} = 1 \Rightarrow C = 2x \Rightarrow \frac{x}{C} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha\alpha = 11,55$

Δ3.

β. Έστω x mol καθαρού S στο δείγμα



$$n_{\text{ολικά NaOH}} = 2x + 2x = 4x \text{ mol}$$

$$n_{\text{NaOH}} = cV = 0,5 \cdot 2 = 1 \text{ mol}$$

$$4x = 1 \Rightarrow x = 0,25 \text{ mol}$$







$$m_{\text{καθαρού S}} = 32x = 8\text{g}$$

Στα 10g ακάθαρτου δείγματος περιέχονται 8g καθαρού S

Στα 100g ακάθαρτου δείγματος περιέχονται 80g καθαρού S

Άρα η περιεκτικότητα του δείγματος είναι 80% w/w σε S.

γ. Το τελικό διάλυμα περιέχει δύο άλατα NaCl και Na_2SO_4



Άρα προέκυψαν υδροξείδια στο διάλυμα, συνεπώς το διάλυμα θα είναι βασικό αφού $[\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$